

# Paciento kortelė

Šioje paciento kortelėje pateikiama svarbi saugumo informacija, kurią privalote žinoti gydymo Aubagio® metu.

**Parodykite šią kortelę visiems gydytojams arba sveikatos priežiūros specialistams dalyvaujantiems Jūsų sveikatos priežiūroje (pvz., skubių medicininių problemų atveju, kai Jus prižiūri ne jūsų gydytojas).**

Aubagio® skirtas gydyti suaugusius pacientus, sergančius recidyvuojančia remituojančia išsėtine skleroze.

Šis vaistas gali paveikti Jūsų kepenų funkciją. Jis taip pat gali turėti įtakos Jūsų kraujo ląstelių kiekiui ir imuninei sistemai, taip pat gali padidinti infekcijos / sunkių infekcijų riziką.



Paciento vardas: .....

Pirmojo Aubagio® skyrimo data: \_ \_ \_ \_ / \_ \_ / \_ \_

Centro pavadinimas: .....

Gydančio gydytojo vardas: .....

Gydančio gydytojo telefono numeris: .....



## Jei pasireiškė kuris nors iš šių simptomų, nedelsiant kreipkitės į gydytoją:

- Nepaaiškinamas pykinimas
- Vėmimas
- Skrandžio skausmas
- Patamsėjęs šlapimas
- Odos arba akių baltymų pageltimas

## Jeigu Jūs esate vaisingo amžiaus moteris, prieš pradėdama vartoti Aubagio® neturėtumėte būti nėščia.

Prieš skirdamas Aubagio® gydytojas dėl atsargumo gali paprašyti atlikti nėštumo tyrimą. Be to, turite vartoti / naudoti veiksmingą kontracepcijos priemonę, aptartą su gydytoju. Aubagio® neturi įtakos geriamųjų hormoninių kontraceptikų veiksmingumui. Prieš nutraukiant kontraceptinės priemonės vartojimą / naudojimą gydymo Aubagio® metu ar keičiant ją kita, turėtumėte pranešti savo gydytojui. **Jeį yra bent mažiausia tikimybė, kad galite būti nėščia, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.**

Taip pat turėtumėte pasitarti su gydytoju, jei planuojate žindyti ar jau žindote. **Būtinai turite atlikti kraujo tyrimus ir stebėti jų rezultatus bei stebėti kraujospūdį, kaip nurodė gydytojas. Taip pat nepamirškite turėti visų vartojamų vaistų ir medicininių būklių sąrašo kiekvieno vizito pas sveikatos priežiūros specialistą metu. Nepageidaujamos reakcijos arba nėštumo atveju, gydytojas gali rekomenduoti pagreitintą pašalinimo iš kraujo procedūrą, siekiant paspartinti Aubagio® pašalinimą iš organizmo.**

Pagreitinto pašalinimo procedūra atliekama nutraukus gydymą teriflunomidu. Ši procedūra apima: 8 g kolestimamino dozę 3 kartus per parą 11 dienų, arba galima vartoti 4 g kolestimamino dozę 3 kartus per parą, jei 8 g kolestimamino dozė 3 kartus per parą netoleruojama gerai; arba 50 g aktyviosios anglies miltelių dozė kas 12 valandų 11 dienų. Šios procedūros veiksmingumas turi būti patvirtintas gydytojo paskirtais kraujo tyrimais.

### **Detalesnė informacija pateikiama Aubagio® pakuotės lapelyje.**

### **Dėl papildomos informacijos arba norėdami pranešti apie nepageidaujamas reakcijas (šalutinius poveikius), kreipkitės į gydytoją.**

Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai šiais kontaktais: paštu VVKT prie LR SAM, Žirmūnų g. 139A, LT09120 Vilnius arba nemokamu faksu (8 800) 201 31, el. paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt), nemokamu telefonu 8 800 735 68.

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.