

Informacija pacientui

- Šioje kortelėje pateikiama svarbi saugumo informacija, kurią Jums reikia žinoti prieš Jums skiriant CAPRELSA ir gydymo CAPRELSA metu.
- Parodykite šią kortelę visiems Jus gydantiems gydytojams. Jei Jums pasireiškia bet koks šalutinis poveikis, pasitarkite su gydytoju, vaistininku ar slaugytoja. Tai apima visus pakuotės lapelyje neišvardytus šautinius poveikius. Taip pat apie šalutinį poveikį galite pranešti tiesiogiai:

UAB „Sanofi-Aventis Lietuva“ telefonu (8-5) 275 5224, elektroniniu paštu:

Pharmacovigilance.Lithuania@sanofi.com arba per

interneto svetainę: www.sanofi.lt

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos.

CAPRELSA gali sukelti širdies elektrinio aktyvumo pokyčių, vadinamų **koreguoto QT intervalo pailgėjimu**, kuris gali sukelti nereguliarų širdies plakimą bei gyvybei pavojingus širdies ritmo pokyčius.

Vartojant CAPRELSA gali pasireikšti smegenų sindromas vadinamas **užpakalinės laikinosios encefalopatijos sindromas** (*PRES*, angl. *posterior reversible encephalopathy syndrome*, dar žinoma, kaip laikinosios užpakalinės leukoencefalopatijos sindromas [*RPLS*, angl. *reversible posterior leukoencephalopathy syndrome*]).

Gydymo CAPRELSA metu paskambinkite savo gydytojui arba nedelsiant pasakykite savo globėjui, jei:

- Jaučiate silpnumą, galvos svaigimą ar nereguliarus širdies dūžius, nes tai gali būti koreguoto QT intervalo pailgėjimo simptomai
- Jums skauda galvą, atsiranda priepuoliai, traukuliai, sumišimas, regėjimo ar mąstymo problemos, nes tai gali būti *PRES* simptomai

Nenutraukite CAPRELSA vartojimo ir nekeiskite dozės, nebent taip liepė gydytojas.

Jei suvartojote per daug CAPRELSA tablečių, nedelsiant skambinkite savo gydytojui.

Paciento vardas, pavardė: _____
Paciento globėjo vardas, pavardė: _____
Paciento globėjo telefono numeris: _____
Gydytojo vardas, pavardė: _____
Gydytojo telefono numeris: _____
Gydymo CAPRELSA pradžios data: _____

Įsitikinkite, kad eidami vizito pas savo gydytoją pasiėmėte visų kitų
vartojamų vaistų sąrašą.

Daugiau informacijos pateikiama CAPRELSA pakuotės
lapelyje.

Paciento įspėjamoji kortelė: CAPRELSA®▼ (vandetanibas)

▼ Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėseną. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Daugiau informacijos, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, pateikiama www.sanofi.lt

