

## Informacija apie LEMTRADA® (alemtuzumabą), kurią reikia žinoti

Gydymas **LEMTRADA** gali didinti toliau išvardytų sutrikimų riziką.

- **Autoimuniniai sutrikimai, pvz.:**
  - kraujavimo sutrikimas (vadinamoji imuninė trombocitopeninė purpura, ITP);
  - retas inkstų sutrikimas, pvz., glomerulų bazinės membranos antikūnų [anti-GBM] liga;
  - skydliaukės sutrikimai (hipotiroidizmas ar hipertiroidizmas).
- **Sunkios infekcijos**

**Gydytojams:** daugiau informacijos pateikta LEMTRADA PCS.

		IS slaugytoja
		praktikos gydytojas
		Bendrosios
		Neurologas
Telefono, fakso numeris	Vardas, pavardė	

Paciento vardas ir pavardė: \_\_\_\_\_

(-ams).  
ir (arba) tyrimų rezultatus, toliau paminėtam (-iems) gydytojui  
medicininį ir/arba kopijas, įskaitant duomenis apie bet kokio gydymo  
Jei bus atliekamas bet koks medicininis tyrimas, pateikite visų  
kontaktiniai duomenys.  
dalyvaujančių kitų gydytojų ar sveikatos priežiūros specialistų  
nurodytu telefono numeriu. Gali būti pateikti ir mano priežiūroje  
Su man **LEMTRADA** skyrusiu neurologu galiu susisiekti toliau

## Paciento įspėjamoji kortelė

*Prašome šią kortelę visada nešiotis su savimi ir parodyti ją visiems skubios pagalbos bei kitiems sveikatos priežiūros specialistams, kad juos informuotumėte apie savo gydymą LEMTRADA.*

**Aš sergu išsėtine skleroze (IS) ir buvau gydomas LEMTRADA, kuris veikia imuninę sistemą.**

**Aš dalyvauju specialioje stebėjimo programoje ir man 4 metus nuo paskutinės infuzijos atliekami kas mėnesiniai tyrimai.**

**Svarbus šalutinis poveikis, kurį būtina pastebėti**

**Nedelsiant kreipkitės į neurologą ir praneškite apie šiuos simptomus, nepaisant, ar tai naujai atsiradę simptomai, ar pablogėję jau esami, ar vėl pasireiškė jau buvę simptomai. Jei negalite susisiekti su gydytoju, kreipkitės skubios medicininės pagalbos. Parodykite jiems šią kortelę.**

**Imuninė trombocitopeninė purpura (ITP)**

- Mažos išsisklaidžiusios odos dėmės (jos gali būti raudonos, rausvos ar violetinės)
- Lengvai atsirandančios kraujosruvos
- Sunkiau sustabdomas kraujavimas įsijovus
- Gausesnės, ilgesnės ar dažnesnės nei įprasta menstruacijos
- Kraujavimas tarp menstruacijų arba sunkesnis menstruacinis kraujavimas
- Kraujavimas iš dantenų ar nosies (anksčiau nepasireiškęs ar trunkantis ilgiau nei įprasta)
- Kraujo atkosėjimas (taip pat gali būti inkstų problemų požymis)

**Inkstų problemos**

- Kraujas šlapime (šlapimas gali tapti raudonos ar arbatos spalvos)
- Kojų ar pėdų patinimas

**Sunkios infekcijos**

- Karščiavimas ir (arba) šaltkrėtis
- Liaukų patinimas
- Dusulys, kosulys, švokštimas, krūtinės skausmas ar spaudimas ir atkosėjimas krauju

Šalutinis poveikis gali pasireikšti praėjus daug metų po gydymo LEMTRADA kurso.

Labai svarbu, kad kasmėnesiniai tyrimai būtų tęsiami (net jei jaučiatės gerai).



**Sutrikimą nustačius ir diagnozavus anksti, būklės pagerėjimo tikimybė gali būti didžiausia.**



**Turite toliau stebėti, ar neatsiranda požymių ar simptomų.**



**Tai būtina daryti 4 metus po paskutinio gydymo LEMTRADA kurso.**