

Toujeo® (insulinas glarginas 300 vienetų/ml) Vadovas pacientams ir (arba) globėjams

Jeigu Jums skirta vartoti Toujeo®, sveikatos priežiūros specialistas turi Jus išmokyti, kaip naudoti Toujeo® SoloStar® švirkštinį, be to, turite perskaityti išsamias naudojimo instrukcijas, esančias kartu su švirkštikliu pateiktame pakuotės lapelyje. Ši kortelė yra tik vadovas.

✓ Neišmeskite šios kortelės, nes gali prireikti ją vėl perskaityti.

Ant kortelės užrašykite savo vardą ir pavardę: _____

✗ Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Toujeo® SoloStar® tai užpildytas injekcinis švirkštiklis, kuriame yra insulino glargino (300 vienetų/ml). Tai yra modifikuotas insulinas, labai panašus į žmogaus insuliną. Toujeo® mažina cukraus kiekį kraujyje pastoviai ilgą laikotarpį. Šis vaistas vartojamas vieną kartą per parą.



Toujeo® SoloStar® švirkštiklio dozės langelyje rodomas Toujeo® vienetų skaičius, kurie bus suleisti.

✗ **Negalima atlikti jokių dozės perskaičiavimų: reikia pradėti vartoti tokią dozę vienetais, kokia nurodyta Jūsų recepte.**

Insulinas glarginas 300 vienetų/ml (Toujeo®) ir insulinas glarginas 100 vienetų/ml (Lantus®) nėra bioekvivalentiški ir nėra tiesiogiai sukeičiami be dozės koregavimo (tai reiškia, kad šie vaistai nėra tokie patys ir jų negalima keisti vienas kitu nekoreguojant dozės).

Gydymą vienu insulinu keisti kitu galima tik nurodžius sveikatos priežiūros specialistui. Visada vartokite naują Jūsų sveikatos priežiūros specialisto rekomenduotą dozę.

Gydymo keitimo metu ir pirmosiomis savaitėmis po jo reikia atidžiai stebėti gliukozės kiekį Jūsų kraujyje.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą.

Prieš Toujeo® injekciją

✓ Perskaitykite pakuotės lapelyje pateikiamą naudojimo instrukciją.

ⓘ Jeigu nevykdysite visų šios instrukcijos nurodymų, galite susileisti per didelę arba per mažą insulino dozę.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

Be to, apie šalutinį poveikį galite pranešti Sanofi nemokamu telefonu 8-800 50008 arba el. paštu Pharmacovigilance.Lithuania@sanofi.com